

Zur Statistik der Psoriasis vulgaris.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde
verfaßt und einer hohen medizinischen Fakultät
der Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Elfriede Pissauke

aus Koblenz a. Rhein.

München 1928

Druck von Michael Laßleben in Kallmünz bei Regensburg.

Zur Statistik der Psoriasis vulgaris.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde
verfaßt und einer hohen medizinischen Fakultät
der Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Elfriede Pissauke

aus Koblenz a. Rhein.

München 1928

Gedruckt mit Genehmigung der mediz. Fakultät
der Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität zu München.

Referent: Professor Dr. J. Mayr.



Tag der mündl. Prüfung: 10. März 1928.

dz. Dekan: Geheimrat Professor Dr. Borst.


Die Ätiologie der Psoriasis vulgaris ist noch ein umstrittenes Gebiet, zwei Theorien stehen sich hier scharf gegenüber: die neuropathische und die parasitäre Lehre. Da möglicherweise ein hinreichend großes und zweckmäßig verarbeitetes statistisches Material hier aufklärend wirken kann, haben aus dieser Erkenntnis heraus bereits eine Anzahl von Bearbeitungen über die Häufigkeit des Auftretens der Schuppenflechte stattgefunden. Mir ist die Aufgabe gestellt worden, an Hand der Fälle aus der Dermatologischen Klinik in München die Statistiken für die Jahre 1910 bis 1914 und 1919 bis 1927 zu erweitern, bezw. zu vervollständigen. Die Kriegszeit ist deshalb außer acht gelassen, weil einerseits viele Psoriasiskranke ihres Leidens wegen nicht dienstuntauglich waren und im Felde standen, andererseits auch schwere Fälle von Psoriasis in diesen Jahren, wenigstens soweit es sich um das männliche Geschlecht handelt, den Krankenhäusern der Heimat entzogen wurden, weil sie in den Kriegs- und Etappenlazaretten in Behandlung standen. Aus diesem Grunde ist die Statistik des Krankenhauses in der Heimat unzulänglich und außer Betracht zu ziehen. Ein weiterer Grund spricht für eine Ausschaltung der Statistik während der Kriegsjahre, nämlich der, daß die Kriegsernährung womöglich in Beziehung zum Auftreten der Psoriasis stand. Aber auch dann, wenn man diese Kriegsjahre bei der statistischen Bearbeitung außer Betracht zieht, erfassen die an Hand des Krankenhausmaterials zusammengestellten Fälle immer nur einen Teil der Psoriasiskranken, weil eine beträchtliche Anzahl von Patienten und wahrscheinlich solche, die den besseren Ständen angehören, in Behandlung der Privatärzte stehen. Bedingt durch die wirtschaftlichen Verhältnisse hat sich dieses Bild auch hier in der Weise verschoben, daß in der Nachkriegszeit und besonders Inflationsjahren ein großer Teil der früher wirtschaftlich Starken der Krankenhausbehandlung zugeführt wurden. Soweit bis jetzt statistische Untersuchungen vorliegen, möchte ich diese zusammenfassen, um sie dann meinem Material gegenüberzustellen.

Ich ziehe zum Vergleich die Statistiken von Niessen, Conradi, Kaufmann, Krekeler und Illgen heran und zwar mit der Einschränkung, daß ich hier ebenfalls, um ein einwandfreies Vergleichsmaterial zu erhalten, aus diesen Arbeiten die Fälle der Kriegsjahre unberücksichtigt lasse. Das Gesamtmaterial umfaßt auf diese Weise 1836 Patienten und zwar 1511 Beobachtungen der obengenannten Autoren und 325 Fälle, über die mir Krankengeschichten zur Verfügung standen. Der Zeitraum, innerhalb dessen die Statistiken gemacht wurden, läuft von 1892 bis 1914 und 1919 — 1927. Tabellarisch zusammengestellt ergibt sich folgendes Bild:

Autoren	Summe der Patienten	Männer	Frauen
Nielsen	520	314	206
Conradi	89	59	30
Kaufmann	88	76	12
Krekeler	522	427	95
Illgen	292	219	73
	1511	1095	416
eigene Befunde	325	196	129
	1836	1291	545

Nielsen fand unter 520 Patienten mit Psoriasis 314 Männer und 206 Frauen, also ein Verhältnis der Männer zu Frauen wie 60,4⁰/₀ zu 39,6⁰/₀. Conradi berichtet, daß sich unter 89 Patienten 59 kranke männlichen und 30 weiblichen Geschlechts befunden haben, d. i. 66,3⁰/₀ und 33,7⁰/₀. Bei Kaufmann waren unter 88 Psoriasiskranken 76 Männer und 12 Frauen oder 86,3⁰/₀ männliche und 13,7⁰/₀ weibliche Patienten. Bei Krekeler ergaben sich unter 522 Psoriasiskranken 427 männlichen und 95 weiblichen Geschlechtes, d. i. 81,80⁰/₀ und 18,19⁰/₀. Illgen fand (bei Auslassung der Jahre 1914—1918) 66,37⁰/₀ erkrankte Männer und 33,63⁰/₀ Frauen. Aus all diesen Statistiken ergab sich ein Gesamtkrankenmaterial von 72,24⁰/₀ Männern und 27,76⁰/₀ Frauen, also ein Verhältnis wie 2,66 : 1. Das Material, welches mir in der Dermatologischen Klinik zur Verfügung stand, umfaßt 325 Fälle und zwar 196 Männer = 69,33⁰/₀ und 129 Frauen = 30,67⁰/₀ oder ein Verhältnis wie 2,3 : 1.

Die prozentuale Verteilung der Krankheitsfälle auf die einzelnen Jahre ist aus folgender Kurve und Tabelle zu ersehen:




Jahre	Männer	Frauen	Summe
1910	19 d. i. 9,7 ‰	11 d. i. 8,52 ‰	30
1911	17 " 8,67 "	6 " 4,65 "	23
1912	20 " 10,2 "	11 " 8,52 "	31
1913	16 " 8,11 "	13 " 10,07 "	29
1914	13 " 6,63 "	7 " 5,42 "	20
1919	10 " 5,11 "	12 " 9,30 "	22
1920	15 " 7,65 "	7 " 5,42 "	22
1921	10 " 5,11 "	7 " 5,42 "	17
1922	7 " 3,57 "	5 " 3,87 "	12
1923	12 " 6,12 "	8 " 6,20 "	20
1924	8 " 4,08 "	9 " 6,97 "	17
1925	14 " 7,14 "	15 " 11,62 "	29
1926	16 " 8,11 "	12 " 9,30 "	28
1927	19 " 9,69 "	6 " 4,65 "	25
	196	129	325

Wie man aus meiner Aufstellung ermitteln kann, beträgt der Durchschnittsprozentsatz aus der Gesamtheit der Fälle berechnet aus den Jahren 1910—1914 und 1919—1927 pro Jahr für Männer und Frauen jeweils 7,1 ‰. Sehen wir nun zu, wie die Verhältniszahl tatsächlich ausfällt, so gibt uns die Tabelle und Kurve darüber interessante Aufschlüsse. Im Jahre 1910 liegen die Kurven für Männer und Frauen nicht allzu weit von einander entfernt (9,7 ‰ zu 8,52 ‰) während wir dann aber die Erkrankungen bei den Männern bis zum Jahre 1912 auf annähernd der gleichen Höhe sich halten sehen, zeigt die Kurve der Frauen im Jahre 1911 einen Abfall auf fast die Hälfte gegenüber dem Jahre 1910, um von 1911 bis 1913 stetig bis zum Maximum von 10,07 ‰ zu steigen. Von da ab bis zum Kriegsbeginn erfolgt wieder ein Abfall, ebenso wie die Männererkrankungen vom Jahre 1912—14 zurückgehen. Am Endpunkt ist ähnlich wie am Anfang die Differenz zwischen den Erkrankungen der Männer (6,63 ‰) und der Frauen (5,42 ‰) nicht mehr erheblich, dagegen ist die Gesamtzahl der Psoriatiker beiderlei Geschlechtes gegenüber dem Jahre 1910 gesunken. Interessant ist hierbei die Tatsache, daß zwischen den Jahren 1912—14 die größere Anzahl erkrankte Frauen waren. Das Jahr 1919 folgt wieder mit einer prozentual höheren Frauenziffer und zwar überwiegen die Frauen die Männer um 4,19 ‰ hinsichtlich der Erkrankung. Vom Jahre 1920 ab ändert sich das Verhältnis in der Weise, daß die männlichen Kranken in der Mehrzahl sind, während der Stand der erkrankten Frauen sich 1920—21 auf einer verhält-

nismäßig niedrigen Höhe bewegt, um bis zum Jahre 1922 seinen Tiefstand mit 3,87⁰/₀ zu erreichen. In diesem Jahre fällt aber auch die Männerkurve auf ihr tiefstes Niveau von 3,57⁰/₀, bleibt also noch unter der Frauenzahl. Dieser Zustand, nämlich das Überwiegen der Frauenerkrankung, hält ununterbrochen bis zum Jahre 1926 an, im Jahre 1925 finden wir sogar 11,62⁰/₀ Frauen an dem Leiden beteiligt, einen Prozentplatz, dem die Männererkrankungen in den 14 Jahren, die ich zur Berechnung heranzog, nie erreichten. Vom Jahre 1924 ab steigt die Kurve der Männer stetig, kreuzt 1926 die Frauenkurve und erreicht 1927 wieder ein Maximum mit 9,69⁰/₀, während in diesem Jahre die Anzahl der erkrankten Frauen auf 4,65⁰/₀ zurückgegangen ist.

Übereinstimmend wird von allen Autoren der Einfluß der Jahreszeit für das Auftreten resp. Rezidivieren oder auch für Besserung und Verschlimmerung des Leidens anerkannt. Jarisch behauptet, daß das Frühjahr und der Herbst, namentlich das erstere, kritische Perioden für die Kranken seien, indem zu dieser Zeit in der Regel Neuausbrüche und Verschlimmerungen erfolgten. Krekeler hat in den Monaten Januar und März die meisten Aufnahmen verzeichnet, er läßt aber die Frage offen, ob der Winter einen verschlimmernden Einfluß auf das Leiden ausübe. Illgen stellte dagegen fest, daß die Sommermonate Juni, Juli, August und die Wintermonate Dezember, Januar, Februar die meisten Aufnahmen und die höchste Befudsziffer aufweisen. Die Angaben lauten also keineswegs einheitlich. Wie meine Tabelle und Kurve ausweist, ist

Monate	Männer	Frauen
Januar	11,22 ⁰ / ₀	8,54 ⁰ / ₀
Februar	9,70 "	8,54 "
März	16,32 "	5,42 "
April	10,70 "	7,75 "
Mai	10,70 "	7,75 "
Juni	5,51 "	10,07 "
Juli	10,20 "	8,54 "
August	5,10 "	4,65 "
September	2,55 "	6,97 "
Oktober	5,61 "	10,07 "
November	6,12 "	12,40 "
Dezember	6,12 "	9,30 "



für Männer ein Maximum im März zu konstatieren und für Frauen scheint November der kritische Monat zu sein. Daneben erscheinen noch die Monate Januar für die Männer und Oktober für die Frauen in Betracht zu ziehen sein, alles in allem sprechen meine Befunde dafür, daß die kältere Jahreszeit ungünstiger zu sein scheint.

Die Krekeler'sche Tabelle:

Monate	Männer	Frauen
Januar	9,72 ⁰ / ₁₀	9,08 ⁰ / ₁₀
Februar	10,65 "	8,02 "
März	11,75 "	8,02 "
April	8,84 "	9,08 "
Mai	8,66 "	11,72 "
Juni	7,00 "	10,69 "
Juli	7,71 "	8,56 "
August	7,35 "	7,49 "
September	6,62 "	6,41 "
Oktober	7,12 "	7,49 "
November	7,34 "	7,49 "
Dezember	7,22 "	5,89 "

gibt für Männer den Anfang des Jahres als Maximum des Auftretens der Psoriasis an, während bei ihm für Frauen das Frühjahr den Höchststand zeigt.

Unter den Krankengeschichten, die ich zur Verfügung hatte, fanden sich auch einige diesbezügliche anamnestische Angaben, die ich hier folgen lasse.

Ein 37 jähriges Zimmermädchen leidet seit seinem 16. Lebensjahr an ausgedehnter Psoriasis. Die Patientin gibt an, daß sich ihr Leiden besonders im Herbst verschlimmere.

Eine 20 jährige Prokuristin leidet seit ihrem 13. Lebensjahr an Psoriasis,

die sich besonders an den Streckleiten der Arme und an den Knien lokalisiert. Die Patientin gibt an, daß die Krankheit während des Überganges vom Winter zum Frühjahr an Vehemenz zunehme.

In einem dritten Fall handelt es sich um ein 18jähriges Dienstmädchen, das die Schuppenflechte seit seinem 6. Lebensjahr hat und zwar hauptsächlich ausgedehnt über den Stamm und den Kopf. Nach den Mitteilungen dieser Patientin spielen das Frühjahr und der Herbst für das vermehrte Auftreten der Effloreszenzen eine Rolle.

Bei einem weiteren Patienten, einem 37 Jahren alten Techniker, der seit 4 Jahren an Psoriasis leidet, tritt im Sommer eine Besserung seines Leidens ein.

Ein letzter Fall endlich betrifft einen 62jährigen Landwirt, der seit 30 Jahren erkrankt ist an Psoriasis des Kopfes und der Extremitäten. Bei ihm tritt die Schuppenflechte bedeutend stärker im Winter auf als in den übrigen Jahreszeiten.

Auch diese anamnestischen Angaben scheinen die Auffassung anderer Autoren zu bestätigen, daß der Winter einen verschlimmernden Einfluß auf die Erkrankung ausübt. Mangels weiterer Belege und mit Rücksicht auf die sich widersprechenden Angaben in der Literatur bezüglich des Auftretens zu bestimmten Jahreszeiten möchte ich es unterlassen, Schlüsse dahingehend zu ziehen.

Eine Frage, die uns interessiert, ist die, ob die Psoriasis eine bestimmte Altersklasse besonders bevorzugt. In der Literatur finden sich Angaben, wonach die Psoriasis hauptsächlich im Pubertätsalter zum Vorschein kommt. Doch zahlreiche Fälle und Statistiken sprechen dafür, daß die Schuppenflechte kein Alter verschont und sogar Säuglinge, Kleinkinder, ja noch Greise von dem Leiden befallen werden. Leiner (Dermatol. Wochenschr. Nr. 5, 1927) berichtet von Psoriasis bei einem vierjährigen Kinde, bei dem der ganze Körper wie von einem Hornpanzer umgeben war.

Oppenheim (Dermatol. Wochenschrift Nr. 5, 1927) stellt sogar eine Zunahme der Schuppenflechte bei Kleinkindern und alten Leuten fest. Canelli (Zentralblatt f. Haut und Geschlechtsleiden Bd. 19 S. 231) bringt eine Statistik über die Psoriasis bei Kindern. »Unter 5527 hautkranken Kindern befanden sich 96 mit der Schuppenflechte behaftete, also 7%. Es figurieren in der Statistik 61 Mädchen und 35 Knaben, 7 Kinder standen nach seinen Angaben im Alter von 3–12 Monaten, 8 im 2. bis 7., 37 im 6.–9. und 44 im 10.–12. Lebensjahr.

Der jüngste Patient, der in meinen Krankengeschichten verzeichnet war, hatte ein Alter von $2\frac{3}{4}$ Jahren und der älteste zählte 75 Jahre. Unter den 196 Männern und 129 Frauen, die ich unter dem Krankenmaterial feststellen konnte, ergaben sich bezüglich der Altersklassen, in denen sie zwecks Behandlung ihres Leidens die Klinik aufsuchten, folgende Daten:

Im Alter von	Männer		Frauen	
	Anzahl	‰	Anzahl	‰
1—5	1	0,51 ⁰ / ₀	1	0,77 ⁰ / ₀
6—10	2	1,02 "	2	1,55 "
10—15	3	1,53 "	11	8,53 "
16—20	30	15,30 "	32	24,80 "
21—25	43	21,94 "	36	27,91 "
26—30	32	16,33 "	19	14,73 "
31—35	23	11,73 "	10	7,75 "
36—40	24	12,24 "	6	4,65 "
41—45	15	7,65 "	5	3,88 "
46—50	10	5,10 "	3	2,32 "
51—55	6	3,06 "	3	2,32 "
56—60	2	1,02 "	—	—
61—65	2	1,02 "	1	0,77 "
66—70	1	0,51 "	—	—
71—75	2	1,02 "	—	—

Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist das Auftreten der Psoriasis in den Jahren bis zum 15. Lebensjahr beim männlichen Geschlecht verhältnismäßig gering. Vom 16. Jahre ab findet sich dann schon der hohe Prozentsatz von 15,13⁰/₀, der bis zum 25. Lebensjahre noch bis auf 21,94⁰/₀ steigt, um dann stetig und allmählich, mit Ausnahme der Jahre 36—40, bis zu den höchsten Altersklassen zu fallen. Beim weiblichen Geschlecht setzt die Steigerung schon in den Lebensjahren 10—15 ein, erreicht ebenfalls ihr Maximum mit 27,9⁰/₀ in den Blütejahren und fällt dann allmählich wieder ab. Im Anschluß an meine Tabelle füge ich zwei weitere nach Angaben von Illgen und Krekeler zusammengestellte Tafeln an.


Illgen.

Es standen im Alter von	Männer	Frauen
1—10	11,47 ⁰ / ₀	20,18 ⁰ / ₀
11—15	11,07 "	34,86 "
16—20	23,98 "	22,93 "
21—25	14,76 "	12,84 "
26—30	9,22 "	0,91 "
31—35	10,35 "	—
36—40	7,01 "	0,91 "
41—45	2,95 "	0,91 "
46—50	1,21 "	—
51—55	1,84 "	—

Es standen im Alter von	Männer	Frauen
1—9	—	8,42 ⁰ / ₀
10—14	0,70 ⁰ / ₀	11,58 „
15—20	17,30 „	44,44 „
21—25	20,84 „	23,15 „
26—30	10,07 „	3,17 „
31—40	19,20 „	4,21 „
41—50	14,77 „	3,17 „
51—60	9,13 „	—
61—70	3,04 „	—

Nach der Illgen'schen Tabelle wird für das Auftreten das 16. bis 20. Lebensjahr bei Männern (23,98⁰/₀), bei Frauen das 11.—15. Jahr mit 34,86⁰/₀ bevorzugt. Es erfolgt dann bei Männern ein Sinken der Ziffer bis auf 9,22⁰/₀, um in den Lebensjahren 31—35 nochmals auf 10,33⁰/₀ zu steigen. Ein Ansteigen der Kurve fand ich auch bei dem sonst gleichmäßigen Sinken und zwar in den Lebensjahren 36—40. Bei Krekeler ist ebenfalls das 21—25. Lebensjahr beim männlichen Geschlecht das Maximum der Erkrankung und auch bei ihm sinkt dann die Erkrankungsziffer bis zum 30. Jahr. Das 4. Jahrzehnt dagegen weist wieder einen Anstieg auf. Für Frauen gibt Krekeler schon das 15. bis 20. Jahr als das am meisten von der Krankheit heimgesuchte an, jedoch weist auch das 21. bis 25. Lebensjahr noch eine verhältnismäßig hohe Ziffer (23,15⁰/₀) auf. Es erscheint demnach ziemlich sicher, daß das 20. bis 25. Lebensjahr und das 4. Jahrzehnt bei Männern das am meisten betroffene ist, während die Frauen um das 20. Jahr herum die meisten Patienten stellen.

Zur weiteren Veranschaulichung füge ich noch eine Kurve ein, die nach meinen Befunden gezeichnet ist. Die Kurve illustriert die oben gegebene Beschreibung in guter Weise.



Nach Angabe der anderen Autoren belief sich die Behandlungsdauer auf etwa einen Monat. Getrennte Angaben für Männer und Frauen fand ich nicht, sondern nur einen Durchschnittswert für beide zusammen. Wie aus meiner Aufstellung hervorgeht, ist die Behandlungsdauer, berechnet aus dem Durchschnitt der Jahre 1910—1914 und 1919—1927 bei Frauen durchschnittlich eine Woche länger als bei den Männern. Hieraus kann man jedoch nicht schließen, daß die Eruptionen im allgemeinen beim weiblichen Geschlecht länger dauern als beim männlichen, sondern dies Ergebnis mag wohl damit in Einklang zu bringen sein, daß die Frauen beruflich nicht so behindert sind und sich infolgedessen der Krankenhausbehandlung längere Zeit widmen können.

Folgende Tafel ergibt die Behandlungsdauer bei Männern und Frauen während der einzelnen Jahre:

Jahr	Männer	Frauen
1910	26,7 Tage	45,4 Tage
1911	29,2 "	44,6 "
1912	23,5 "	56,7 "
1913	23,2 "	43,4 "
1914	16,7 "	22 "
1919	43,2 Tage	32,3 Tage
1920	30,2 "	30,4 "
1921	38,8 "	41,5 "
1922	38,5 "	35,6 "
1923	45,9 "	32,8 "
1924	38,6 "	34,0 "
1925	49,8 "	48 "
1926	31,6 "	29,6 "
1927	31,5 "	51,3 "
S.S.	467,4 Tage	557,6 Tage
Durchschnitt:	33,4 Tage	39,8 Tage

Bekanntlich werden von der Psoriasis alle Volksschichten befallen, besonders auch die wohlhabende Bevölkerung stellt ein großes Kontingent unter den Psoriasis Kranken. Schon in den früheren Statistiken wurde die Frage aufgeworfen, ob man wohl gewissen Berufen eine Disposition zur Psoriasis zusprechen könnte. Krekeler fand in seiner Aufstellung über die einzelnen Berufsklassen der Erkrankten, daß sich ein großer Prozentsatz aus Arbeitern und Arbeiterinnen zusammengesetzt. Seine Angaben lauten:

»Unter den 423 erwachsenen männlichen Personen 160 Arbeiter = 37,9⁰/₁₀;

unter 81 erwachsenen weiblichen Patienten sogar 47⁰/₀. Gegen diese Zahlen treten die Patienten der anderen Berufsklassen zurück, wenn auch die Handwerker und Professionisten mit 85 Patienten = 20⁰/₀ und die Dienstmädchen, 23 unter 81 Patienten = 28,4⁰/₀ ein großes Kontingent stellen.

Krekeler hebt nun hervor, daß aus diesen Angaben jedoch keine Schlüsse zu ziehen sind auf das hauptsächlichliche Vorkommen der Erkrankung bei Arbeitern, da ja, wie aus der Literatur bekannt ist, die Psoriasis sich auch gerade unter den besser gestellten Leuten verbreitet und sein Krankheitsmaterial vorwiegend aus Krankenkassenmitgliedern bestanden habe, wo viele unter dem Namen »Arbeiter« geführt würden.

Auch hier ist meines Erachtens, wie ich schon in der Einleitung hervorgehoben habe, dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die besser situierten Stände wenigstens vor dem Krieg im allgemeinen die Privatbehandlung vorgezogen haben und deshalb in den Statistiken aus dem Krankenhausmaterial nicht erscheinen.

Ich stellte in unseren Krankengeschichten fest, daß auf eine Gesamtkrankenziffer von 156 Personen männlichen Geschlechtes, bei denen der Beruf angegeben war, auf den Jahresdurchschnitt der Jahre 1910—1914 und 1919—1927 berechnet, 60,9⁰/₀ Angehörige der besseren Stände gegen 39⁰/₀ Arbeiter usw. entfielen. Berechnet man aber das Verhältnis der besser Situierten und Arbeiter usw. vor und nach dem Krieg, so kommt man zu anderen Zahlen. Während vor dem Krieg, also in den Jahren 1910—1914, sich das Prozentverhältnis wie 51,4 : 48,6 stellte, belief es sich nach dem Krieg auf 55,7 : 44,3. Daraus geht hervor, daß die Zunahme der Erkrankung zu Gunsten der besseren Stände geht, denn ihre Anzahl ist relativ um 4,3⁰/₀ gestiegen, während die der Arbeiter um denselben Prozentsatz abgenommen hat. Ich halte es jedoch für abwegig, daraus den Schluß ohne weiteres ziehen zu wollen, daß in den Nachkriegsjahren die Erkrankung bei den besser gestellten Leuten zugenommen hat, halte vielmehr die Tatsache, daß nach dem Krieg die früher besser Situierten, jetzt wirtschaftlich aber Schwachen aus den oben angeführten Gründen die Krankenhausbehandlung mehr als früher suchten, für die Wirkung der Verschiebung.

Für Frauen fand ich die maximale Ziffer bei Dienstmädchen mit 38,78⁰/₀, darnach folgen die Berufslosen mit 17,81⁰/₀ und die Köchinnen mit 12,40⁰/₀. Einen merkwürdig niedrigen Prozentsatz gegenüber Krekeler finde ich bei den Arbeiterinnen. Während Krekeler für Arbeiterinnen 47⁰/₀, also fast die Hälfte aller Fälle ermittelte, stellte ich nur 2,32⁰/₀ fest. Möglicherweise liegt das darin begründet, daß der Begriff »Arbeiterin« das einmal weiter, das anderemal enger gefaßt wird, wahrscheinlicher aber erscheint mir, daß hier örtliche Verhältnisse eine Rolle spielen und zwar in der Weise, daß Leipzig industriereicher als München ist.

Der von Aufpitz vor Jahren gemachte Ausspruch: »Was Psoriasis ist, weiß bis heute noch kein Mensch«, besteht noch immer zu recht. Köbners Reiztheorie, die neuropathische Lehre, die parasitäre Theorie und schließlich die Stoffwechseluntersuchungen, alle konnten das Rätsel nicht lösen und immer wieder war die Entstehungsurache ein Geheimnis, das die Autoren aufzudecken sich vergeblich bemühten. Jedoch es müssen Wege gefunden werden und vielleicht besteht die Möglichkeit, daß mit dieser und noch weiteren Statistiken, Licht in das Dunkel der Ätiologie gebracht wird.

Aus der Literatur sind uns verschiedene Fälle bekannt, bei denen für die Entstehungsurache chemische, thermische und vor allem mechanische Reize verantwortlich gemacht werden. Haxthausen (Dermatologische Zeitschrift Bd. XLVII, S. 78) berichtet von einem 23jährigen Mann, bei dem sich die Psoriasis in einer zwei Jahre alten Tätowierung genau in den roten mit Zinnober imprägnierten Stellen lokalisiert hatte, während die schwarzen, mit Tusche präparierten frei waren. Löwenfeld (Med. Klinik, 1924, Nr. 22) gibt folgendes bekannt:

»Als eine Stütze der Köbner'schen Theorie, daß die Entstehung der Psoriasis eine Disposition der Haut (»parakeratotische Diathese«) auf gewisse Reize hin zugrunde liegt, wird ein Fall beschrieben, bei dem zum ersten Mal eine Psoriasiseruption nach Stichen einer Grasmilbenlarve auftrat, während bei der zweiten Eruption Wanzenstiche als Ursache eruiert werden.«

Danach scheinen bei zur Psoriasis disponierten Leuten äußere Reize Eruptionen veranlassen zu können und die Ansicht bezüglich des vermehrten Auftretens bei Arbeitern vielleicht nicht ganz unbegründet, weil das handarbeitende Volk leichter derartigen Insulten ausgesetzt ist.

Während im allgemeinen die Ätiologie noch unklar ist, wird angenommen, daß hereditäre Momente eine gewisse Beziehung zu der Erkrankung haben, doch sind die Angaben der Autoren auch hierüber verschieden. In der Literatur finden sich Angaben, die von 0—35% schwanken. Es stellen sich ja auf diesem Gebiete der Forschung Schwierigkeiten in den Weg, denn öfters ist den Trägern der unbedeutenden Stellen die Tatsache, daß sie an Psoriasis leiden, ganz unbekannt. Vom weiblichen Geschlecht wird das Leiden manchmal aus naheliegenden Gründen geleugnet. — Besonders in neuerer Zeit hat man sich mit der Frage der Heredität näher beschäftigt und versucht, einzelne Stammbäume für die Psoriasis aufzustellen. Heiner (Zentralblatt für Haut- und Geschlechtsleiden Bd. 20, S. 669) berichtet von 4 Psoriatikerfamilien mit 63 Mitgliedern, daß er 34 Befallene und 28 von dem Leiden Verschonte feststellen konnte. Unter den 34 Erkrankten der 4 Familien haben sich 23 Männer = 53% und 11 Frauen = 37% befunden. Aus der Ehe von zwei Psoriatikern seien zwei kranke und ein gefundes Kind hervorgegangen. Von 136 Psoriasis-kranken der Klinik konnte

Heiner (Zentralblatt für Haut- und Geschlechtsleiden Bd. 22, S. 667) in 17⁰/₀ der Fälle familiäres Auftreten auf Grund der Anamnese, bei 46 Privatpatienten in 29⁰/₀ der Fälle feststellen. Dieser Unterschied des Prozentsatzes zwischen Klinik- und Privatpatienten mag wohl darauf beruhen, daß sich die Privatpatienten meistens mehr aus besser gestellten Volksklassen zusammensetzen, die mehr auf die Gesundheit ihres Körpers bedacht sind und infolgedessen allen schädlichen Einflüssen eindringlicher nachspüren und aufzudecken suchen.

Siemens, der sich eingehend mit dem Studium der Heredität der Psoriasis beschäftigte, kam zu dem Ergebnis, daß die Psoriasisdisposition eine unregelmäßig dominante Vererbung zeigt.

Unter meinen 325 Psoriasfällen konnte ich nur fünfmal Angaben über irgendwelche erbliche Zusammenhänge finden. Ich lasse einige hiervon folgen.

Ein 38 Jahre alter Sägearbeiter leidet seit 17 Jahren an Psoriasis der Extremitäten. Zwei Schwestern von ihm sind von derselben Krankheit befallen.

Eine 23jährige Kontoristin. Seit ihrem 2. Lebensjahr ist sie von der Schuppenflechte befallen, die sich über den ganzen Körper hin ausdehnt. In ihrer Familie ist die Psoriasis bis ins vierte Glied und zwar vorzüglich beim weiblichen Geschlecht verfolgbar.

Ein 22jähriger Landwirt gibt an, daß er seit 5 Jahren an der Schuppenflechte erkrankt ist und innerhalb dieser Zeit dreimal Rezidive gehabt habe. Das Leiden äußert sich bei ihm hauptsächlich an den Knien und Ellbogen. Ein Onkel von ihm ist gleichfalls ein Psoriatiker.

Ein 13jähriges Kind leidet seit 9 Jahren an Schuppenflechte, lokalisiert an den Armen und am Stamm. Die Mutter des Kindes weist dieselbe Erkrankung auf.

Die Anzahl dieser Fälle ergibt nur einen sehr geringen Prozentsatz in Bezug auf die Erbllichkeit. Es sind nur 1,54⁰/₀. Da andere Autoren viel höhere Prozentzahlen angeben, z. B. von Poor = 34,4⁰/₀, Willson = 30,0⁰/₀, Jordan = 23⁰/₀, Rosenthal = 15⁰/₀ (Dermatologische Zeitschrift Bd. 48 S. 176), wird meine niedrige Prozentziffer darauf zurückzuführen sein, daß Klinikpatienten nicht so imstande sind, diesbezügliche anamnestische Angaben zu machen.

Zusammenfassend ergibt sich:

Die Statistik der letzten Jahre auf Grund des Materials der Dermatologischen Klinik der Universität in München weicht insoweit von den früheren Bearbeitungen desselben Themas ab, daß vom Jahre 1920 bis 1926 der durchschnittlich höhere Prozentsatz der Erkrankungen von den Frauen gestellt wurde. Ob der im Jahre 1927 erfolgte Anstieg der Erkrankungen bei Männern eine Ausnahme ist oder die Einleitung zur Wiederkehr der früher allgemein als gültig angenommenen Verhältniszahl, müßten weitere

Untersuchungen der nächsten Jahre ergeben. Der Durchschnittsprozentsatz von 1920—1927 ergibt auf die Gesamtzahl der zur Berechnung herangezogenen Jahre und Fälle bezogen für Männer 51,47⁰/₀ und für Frauen 53,45⁰/₀, also ein Verhältnis wie 1 : 1,03 im Gegensatz zu den von anderen Autoren ermittelten von 2,66 : 1 oder im Gegensatz zu meinem Gesamtergebnis der 14 Jahre wie 2,3 : 1.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. J. Mayr für die gütige Überlassung des Themas sowie für die Ratschläge und Durchsicht der Arbeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Literatur=Verzeichnis.

- Brock, Ein Beitrag zur Behandlung der Psoriasis vulgaris und anderer Dermatosen. Derm. Zeitschrift 1924 Nr. 5. Bd. 29.
- Canelli, Psoriasis bei Kindern. Zentralblatt für Haut- und Geschlechtsleiden, Bd. 19.
- Conradi, Klinische Analyse und therapeutische Bemerkungen über 2500 Fälle aus der Dermatologischen Abteilung der Wiener Allgemeinen Poliklinik, beobachtet im Studienjahr 1897/98. Diff. Leipzig 1906.
- Corson, Psoriasis. Zentralblatt für Haut- und Geschlechtsleiden Bd. 14.
- Gerstle, Über Psoriasis vulgaris und deren Behandlung. Diff. München 1902.
- Haxthausen, Auftreten der Psoriasis nach Tätowierung. Dermatol. Zeitschrift Bd. XLVII.
- Hebra, Lehrbuch der Hautkrankheiten. 1874.
- Heiner, Beiträge zur Erblichkeit der Psoriasis. Zentralblatt für Haut- und Geschlechtsleiden Bd. 22.
- Illgen, Beiträge zur Statistik der Psoriasis vulgaris. Diff. Leipzig 1920.
- Jarisch, zit. bei Gerstle. Diff. München 1902.
- Jeßner, Die Schuppenflechte. Dermatologische Vorträge für Praktiker, Heft 13.
- Kaufmann, Beiträge zur Kenntnis der Psoriasis vulgaris. Diff. Leipzig 1904.
- Krekeler, Beiträge zur Statistik der Psoriasis vulgaris. Diff. Leipzig 1912.
- Kumer, Über die Therapie der Psoriasis. Wien. Klinische Wochenschrift 1924, Nr. 36.
- Leiner, Dermatolog. Wochenschrift 1927, Nr. 5.
- Lipschütz, Untersuchungen über Psoriasis vulgaris, Archiv für Dermatologie und Syphilis. Bd. 127 S. 849.
- Löwenfeld, Med. Klinik 1924, Nr. 22.
- Marcuse, Zur Frage der Erblichkeit und des Wesens der Psoriasis. Dermat. Zeitschrift 1911, Bd. 18.
- Nielsen, zitiert bei Krekeler.
- Oppenheim, Dermatologische Wochenschrift 1927, Nr. 5.
- Pinkus, Psoriasis. Deutsche Klinik Bd. 10, Abt. II.

Riedke, Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten 1923.

Schamberg, Bekanntes und Unbekanntes über Psoriasis vulgaris. Dermatol. Wochenschrift Nr. 9, 1925.

Veiel, Die Behandlung der Psoriasis. 1925. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Dermatologie und Syphilidologie.

Zumbusch v., Psoriasis: Praktische Ergebnisse auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 1912, Bd. 2.

Lebenslauf.

Am 16. August 1901 wurde ich, Elfriede Pissauke, in Koblenz a. Rhein geboren. Nach bestandener Reifeprüfung Ostern 1924 am Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium zu Koblenz studierte ich wechselweise in München und Berlin 8 Semester Zahnheilkunde. Die zahnärztliche Vorprüfung bestand ich in München Anfang des Wintersemesters 1925/26. Das zahnärztliche Staatsexamen im November 1927.

